

## 来优时®（甘精胰岛素 300 U/mL）

来优时®SoloStar®, 预填充式注射笔

### 针对患者和/或照护人员的指南：

- 如果医生给您处方了来优时®, 您必须接受医疗卫生专业人士提供的关于如何使用来优时®注射笔的培训, 且必须阅读完整的说明。《使用说明》随注射笔提供。
- 本文件仅作为指南使用。
- 请根据您的医疗处方上标明的剂量起始用药。

### 处方来优时®最初几周内的重要信息

- 甘精胰岛素 300 U/mL (来优时®) 和甘精胰岛素 100 U/mL 不具备生物等效性, 不能直接转换。
  - 在将甘精胰岛素 100 U/mL 转换为甘精胰岛素 300 U/mL 时, 可以以等量单位为基础进行转换, 但为了使血糖水平达到目标范围, 所需的甘精胰岛素 300 U/mL 剂量可能更高 (约 10-18%)。
  - 在将甘精胰岛素 300 U/mL 转换为甘精胰岛素 100 U/mL 时, 应减少剂量 (约 20%) 以降低低血糖的风险。
- 只有在您的医生开具处方的情况下, 您才能从一种胰岛素治疗方案转换为另一种胰岛素治疗。应始终遵循您的医生推荐的剂量。
- 在转换及转换后的最初几周内需要对您的血糖进行密切监测。
- 甘精胰岛素 300 U/mL 的目前在售形式:

来优时®SoloStar® (1.5 mL 预填充式注射笔/450 U)



来优时®SoloStar®的最低剂量单位为 1U。剂量窗可显示注射的单位数量。

如需进一步信息, 请咨询您的医疗卫生专业人员。

注射来优时®前, 请阅读包装说明书中的使用说明。

如果您发生了任何用药错误或副作用, 请告知您的医生或药师。其中包括在说明书中未列出的任何可能的副作用。

您也可以通过电话<800(400)-820-8884>或电子邮件<PV.CN@sanofi.com>向赛诺菲报告副作用。