



丙戊酸男性患者指南 —为有生育能力的男性患者

请仔细阅读本指南及产品说明书
以获取完整的产品信息

丙戊酸盐* <德巴金®> 您应该知道的一切

本指南包含在生育孩子时使用丙戊酸盐的潜在风险的关键信息，如果您有任何疑问，请咨询您的医生或药剂师。

请保留本指南，您可能需要再次阅读。

有关有生育能力的男性患者使用丙戊酸盐的潜在风险信息也可在 <http://www.sanofi.cn> 上找到。

*丙戊酸盐产品，包括含丙戊酸、丙戊酸钠、双丙戊酸钠、丙戊酸镁和丙戊酰胺的产品。

生育孩子时服用丙戊酸盐*有什么风险？

一项研究表明，与拉莫三嗪或左乙拉西坦等其他可用于治疗您疾病的药物相比，在受孕前3个月内接受丙戊酸盐治疗的父亲所生孩子的智力和/或运动发育受损风险更高。

在这项研究中，当父亲接受丙戊酸盐治疗时，每 100 名儿童中约有 5 名患有此类疾病，而当父亲接受其他药物治疗时，每 100 名儿童中约有 3 名患有此类疾病。

在受孕前至少3个月停用丙戊酸盐的男性患者所生儿童的风险尚不清楚。

这对您意味着什么？

作为预防措施，您的医生将与您（和/或您的父母/监护人）讨论，如果您接受丙戊酸盐治疗，在受孕时存在的潜在风险以及与使用丙戊酸盐相关的预防措施：

- 在治疗期间以及停止丙戊酸盐治疗后 3 个月内，您和您的女性伴侣需要使用**有效的避孕措施**。
- 一旦您计划生育孩子，应在停止避孕前咨询医生，以**讨论替代治疗方案**。
- 治疗期间和停药后3个月内**不得捐献精子**。

如果您在受孕前3个月内使用过丙戊酸盐，则**您和您的女性伴侣都应在发现怀孕时联系医生**进行咨询。

在未咨询医生的情况下，**请勿自行停用丙戊酸盐**。如果您停止治疗，您的症状可能会恶化。

您应该**定期（至少每年）与您的医生预约复诊**。在治疗开始时和年度随访时，您的医生将要求您阅读<并签署>风险确认表，这是为了确保您了解并认识到受孕时使用丙戊酸盐有关的潜在风险。

*丙戊酸盐产品，包括含丙戊酸、丙戊酸钠、双丙戊酸钠、丙戊酸镁和丙戊酰胺的产品。



请参阅产品说明书以获取更多详细信息

sanofi