

# 移交

## 患者卡片：

- 填写患者卡片中的联系方式，并在必要时进行更换
- 向患者或其法定代表提供患者卡，并定期在每次就诊期间讨论内容，**治疗期间至少每年一次**
- 教育患者或其法定代表向参与医疗护理的医生或医疗保健专业人员出示此卡（例如紧急情况下）
- 提醒患者在发生任何不良事件时联系医生，尤其是在患者卡片中讨论的肝脏疾病症状和感染的情况下
- 在治疗前和治疗后定期向有生育能力的女性 (WOCP)（包括青少年/其父母/看护者）告知对胎儿的潜在风险
- 提醒患者在怀孕时联系医生。

在特立氟胺获批后报告疑似不良反应非常重要；其允许继续监测特立氟胺的获益/风险平衡

- 要求参与医疗护理的医生或医疗保健专业人员通过国家报告系统（国家药物不良反应监测中心）网站<http://www.adrs.org.cn>报告任何疑似不良反应，包括妊娠

已告知患者并理解上述与该治疗相关的风险和获益

处方者姓名：

处方者签名：

# 特立氟胺

## 医疗保健专业人员指南



- 与患者讨论本手册中讨论的风险
- 完整处方信息请阅读产品说明书 (PI)

患者姓名：	患者年龄：
首次访视日期：	患者性别： <input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性
首次处方日期：	当前日期：

sanofi

sanofi



## 全血细胞计数 (CBC)

- 血细胞减少的风险（主要影响白细胞）
- 治疗开始前和之后（如必要），根据治疗期间的临床体征或症状进行全血细胞计数



- （严重机会性）感染风险
- 如果出现感染的体征或症状，或者如果患者使用了其他影响免疫系统的药物，需要立即联系医生
- 如果发生严重感染，考虑加速消除程序



## 血压

- 高血压风险
- 治疗开始前和治疗期间定期检查血压
- 如果发生高血压，需要联系医生



- 肝脏影响风险
- 治疗开始前和治疗期间定期检查肝功能
- 肝病的体征和症状
- 如果出现症状，需要立即联系医生



## 对于有生育能力的女性 (WOCP)，包括青少年

- 致畸性的潜在风险
- 开始治疗前检查妊娠状态
- 检查所有WOCP（包括18岁以下患者）的妊娠可能性
- 应排除妊娠
- 治疗开始前、治疗期间和治疗后需要有效的避孕措施
- 如果停止避孕或在改变避孕措施之前需要立即联系医生
- 如果妊娠，需要停用本品并立即联系医生
- 考虑加速消除程序
- 通过致电800(400)-820-8884或发送电子邮件至 [PV.CN@sanofi.com](mailto:PV.CN@sanofi.com) 向赛诺菲报告任何妊娠病例，不论是否观察到的不良结局

## 儿童女性的父母/看护者

- 一旦女童出现月经，父母/看护者需要联系医生