

医务人员教育及讨论指南

开具处方者/医生应该在首次处方时与患者讨论以下有关风险的信息，并向患者提供患者卡。
请参阅产品说明书了解完整处方信息。

患者姓名:	患者年龄:
首次就诊日期:	患者性别: 男性 <input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/>
首次处方日期:	今日日期:

肝脏的影响

- 请根据说明书与患者讨论肝脏影响的风险，以及治疗前和按适应症治疗期间需要定期检查肝功能的必要性。请教育患者了解肝病的症状和体征，如果这些情况有进展，需要联系医生。

妊娠及哺乳

对于育龄女性，请排除妊娠，并强调在开始和维持特立氟胺治疗时采取有效避孕措施的必要性：

- 建议患者停止避孕或在改变避孕措施前应立即联系医生或医务人员。
- 如果女性患者尽管采取了避孕措施，但仍然怀孕，她应该停止使用特立氟胺并立即联系医生，医生应该：
 - 考虑并同患者讨论加速消除药物的措施

血液系统的影响

- 请与患者讨论血细胞计数减少的风险（主要影响白细胞）。讨论治疗前以及治疗期间出现症状和体征时做血常规检查的必要性。

高血压

- 请与患者讨论血压升高的风险。教育患者若有高血压应告知医生，并和患者讨论在治疗前和治疗期间定期测血压的必要性。

感染

- 请与患者讨论感染/严重机会性感染的风险，包括告知患者当出现感染体征或症状时需要联系他们的医生，并且如果患者服用影响免疫系统的其他药物，也应告知医生。如果发生严重感染，可考虑加速消除药物的措施。

患者卡

- 请向患者提供患者卡，以作为提醒患者的工具，该患者卡也有助于将信息传递给伴随医疗护理中涉及的医生（特别是在急诊和/或有新医生参与医疗护理）。请提醒患者在出现患者卡中提及的症状或体征时联系医生。

患者已经被告知并了解与此治疗相关的受益和风险。已对女性患者进行妊娠检查，提出需要采取可靠避孕措施的建议，并告知有在必要时选择特立氟胺加速消除措施。

在重新开处方时，检查不良事件，讨论正在进行的风险及其预防，并进行检查以确保进行充分的监测。

处方人姓名:	处方人签名:
--------	--------