

如需了解更多信息或报告不良反应事件，请联系您的医生。

请阅读特立氟胺产品说明书以获取更多信息。

此措施包括使用4/8克考来烯胺，每日三次，或使用50克活性炭，每日两次给药，持续11天。

如果发生不良反应或怀孕，医生可能会建议加速清除血液中药物的措施，以加快特立氟胺从身体中清除。

## 患者卡

该患者卡包含重要的安全信息，在接受特立氟胺治疗时请充分知晓这些信息。

请向参与您诊疗的医生或医学专业人士出示此卡片（例如，出现意料外的医疗问题，可能需要其他医生参与诊疗时）。

特立氟胺用于治疗成人复发型多发性硬化。

该药可能影响您的肝功能，也可能影响血细胞计数以及免疫系统，可能增加感染/严重感染的风险。



**如果出现下列任何症状，请立即联系您的医生：**

- 不明原因恶心
- 胃痛
- 皮肤或巩膜黄染
- 呕吐
- 尿色变深

**如果您是育龄女性，在开始特立氟胺治疗前请确认未怀孕。**

您的医生可能会在开具特立氟胺处方前要求进行排除怀孕的检查。此外，用药时您应采取医生认同的有效避孕措施。

特立氟胺不影响口服激素避孕药的疗效。在特立氟胺治疗期间，您应该在改变或停止避孕措施之前通知您的医生。

---

**如果您可能怀孕，请立即与您的医生联系**

如果您计划或正在母乳喂养，您也应该和医生进行讨论。

**请确保您按照医生安排接受后续的血液检查和血压检查。同时，请确保您在每次就诊时都携带所有其他用药和医疗情况的清单。**

患者姓名：\_\_\_\_\_

特立氟胺首次处方日期：\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

处方医院名称：\_\_\_\_\_

接诊医生姓名：\_\_\_\_\_

接诊医生电话：\_\_\_\_\_